



ZONA SERRA D'IVREA E ANFITEATRO MORENICO

AVVISO n° 2 del 14-05-2018

SITUAZIONE

Fase fenologia di grappoli distesi quasi generalizzata. Le precipitazioni recenti (da 12 a 36 mm a seconda delle zone, con bagnature prolungate nelle giornate di sabato, domenica e oggi) unite alla crescita dei germogli riducono l'efficacia del precedente trattamento. Continuano inoltre le previsioni di tempo perturbato per i prossimi giorni.

PERONOSPORA

Considerando la fase fenologica di rischio e le condizioni climatiche favorevoli si consiglia di ripristinare la protezione con prodotti a base di **DIMETOMORF**, **MANDIPROPAMID**, **IPROVALICARB** in miscela con **Dithianon**, **Mancozeb**, **Metiram**, **Rame**, **Folpet** entro **VENERDI' 18 MAGGIO**.

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico un prodotto a pari persistenza: **IBE (tetra, pen, fenbuconazolo)**, **METRAFENONE**, **CIFLUFENAMID**.

Nelle zone solitamente a basso rischio utilizzare uno **ZOLFO BAGNABILE** a dose media di etichetta.

NOTE PER IL PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER USO SOSTENIBILE DEI FITOFARMACI

- Mancozeb e Folpet sono utilizzabili per tre interventi l'anno (max quattro complessivi);
- Dimetomorf, Mandipropamid e Iprovalicarb sono utilizzabili per non più di quattro interventi complessivi (max tre consecutivi);
- IBE indicati sono utilizzabili per tre volte complessivamente;
- Metrafenone è utilizzabile per tre interventi l'anno;
- Ciflufenamid è utilizzabile per due interventi l'anno.

SI RACCOMANDA DI RISPETTARE DOSI E INTERVALLI DI INTERVENTO INDICATI IN ETICHETTA.