



ZONA SERRA D'IVREA E ANFITEATRO MORENICO

AVVISO n° 3 del 26-05-2018

SITUAZIONE

Fase fenologia da bottoni fiorali separati a inizio fioritura. Le segnalazioni di peronospora per la nostra zona sono decisamente sporadiche e limitate al momento. Diffuse quasi ovunque macchie su foglia di Black-rot. Continuano inoltre le previsioni di tempo perturbato per la prima metà della prossima settimana.

PERONOSPORA

Considerando la fase fenologica di rischio e le condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo del fungo si consiglia di ripristinare la protezione intervenendo a **10-12 GIORNI DAL PRECEDENTE INTERVENTO** con prodotti penetranti a lunga persistenza: **AMETOCTRADINA+FOSFONATO DI POTASSIO (ENERVIN PRO), AMETOCTRADINA+METIRAM (ENERVIN TOP), FOSETIL-AL+ZOXAMIDE+CIMOXANIL (ELECTIS TRIO), ZOXAMIDE+CIMOXANIL (LIETO), FLUOPICOLIDE+FOSETIL-AL (R6 ALBIS), CIAZOFAMID+FOSFONATO DI DISODIO (MILDICUT), METALAXIL-M + MANCOZEB (RIDOMIL GOLD MZ), AMISULBROM+MANCOZEB (SANBLIGHT) o +FOLPET (SANVINO).**

OIDIO E BLACK-ROT

Abbinare al trattamento antiperonosporico un prodotto a pari persistenza: **IBE (tetra, pen, fenbuconazolo), METRAFENONE (VIVANDO), CIFLUFENAMID (CIDELY).** In vigneti con presenza di black-rot preferire **IBE** possibilmente in formulazione **COMBI** o strobilurine (**TRIFLOXYSTROBIN**) a dosaggi opportuni.

CARENZE NUTRIZIONALI

Nei vigneti solitamente soggetti a carenze di **Boro** si consiglia di abbinare al trattamento antifungino un concime fogliare a base di questo elemento.

N.B.: consultare le etichette degli antiparassitari utilizzati per valutare la compatibilità delle miscele.

SCAPHOIDEUS TITANUS (VETTORE DI FLAVESCENZA DORATA)

Dai rilievi effettuati si evidenzia la comparsa delle prime forme mobili. Nel prossimo comunicato verranno indicate date e prodotti da utilizzare per il trattamento.

NOTE PER IL PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER USO SOSTENIBILE DEI FITOFARMACI

- Mancozeb e Folpet sono utilizzabili per tre interventi l'anno (max quattro complessivi);
- Metalaxil-m è utilizzabile per tre interventi l'anno;
- Ciazofamid e Amisulbrom sono utilizzabili per tre volte complessivamente;
- Ametoctradina è utilizzabile per tre interventi l'anno;
- Fosfonato di potassio è utilizzabile per 5 interventi e di disodio per 6 l'anno;
- Cimoxanil è utilizzabile per tre interventi l'anno;
- Fluopicolide è impiegabile per due interventi l'anno;
- Zoxamide è impiegabile per quattro interventi l'anno;
- IBE indicati sono utilizzabili per tre volte complessivamente;
- Metrafenone è utilizzabile per tre interventi l'anno;
- Ciflufenamid è utilizzabile per due interventi l'anno.
- Trifloxystrobin è impiegabile per tre interventi l'anno.

SI RACCOMANDA DI RISPETTARE DOSI E INTERVALLI DI INTERVENTO INDICATI IN ETICHETTA.