



ZONA SERRA D'IVREA E ANFITEATRO MORENICO

AVVISO n° 4 del 7-6-2018

SITUAZIONE

Fase fenologia da fioritura a allegagione avvenuta. Continua il periodo di tempo incerto con pochi sprazzi di sole alternati a giorni piovosi, l'umidità relativa si mantiene sempre su livelli alti. Le segnalazioni di peronospora su foglia e grappolo sono limitate ma piuttosto diffuse. Diffuse quasi ovunque macchie su foglia di Black-rot. Importanti per favorire la difesa sono le operazioni di potatura verde: occorre prestare molta cura alla esposizione dei grappoli all'aria con sfogliatura e sfemminellatura, ottenendo in questo modo oltre a una migliore copertura dei trattamenti anche una lotta indiretta alla muffa grigia che inizia ora, sui residui floreali ancora attaccati al grappolo, il suo insediamento. Nei vigneti ove l'allegagione sia avvenuta è già possibile cimare.

PERONOSPORA

Considerando la fase fenologica di rischio e le condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo del fungo si consiglia di ripristinare la protezione intervenendo entro **LUNEDI' 11 GIUGNO e comunque a non più di 10-12 GIORNI DAL PRECEDENTE INTERVENTO** con prodotti penetranti a lunga persistenza: **AMETOCTRADINA+FOSFONATO DI POTASSIO (ENERVIN PRO), AMETOCTRADINA+METIRAM (ENERVIN TOP), FOSETIL-AL+ZOXAMIDE+CIMOXANIL (ELECTIS TRIO), ZOXAMIDE+CIMOXANIL (LIETO), FLUOPICOLIDE+FOSETIL-AL (R6 ALBIS), CIAZOFAMID+FOSFONATO DI DISODIO (MILDICUT), METALAXIL-M + MANCOZEB (RIDOMIL GOLD MZ), AMISULBROM+MANCOZEB (SANBLIGHT) o +FOLPET (SANVINO).**

OIDIO E BLACK-ROT

Abbinare al trattamento antiperonosporico un prodotto a pari persistenza: **IBE (tetra, pen, fenbuconazolo), METRAFENONE (VIVANDO), CIFLUFENAMID (CIDELY).** In vigneti con presenza di black-rot preferire **IBE** possibilmente in formulazione **COMBI** o strobilurine (**TRIFLOXYSTROBIN**) a dosaggi opportuni.

SCAPHOIDEUS TITANUS (VETTORE DI FLAVESCENZA DORATA)

NON TRATTARE DURANTE LA FIORITURA DELLA VITE. Occorre attendere la fine del periodo di fioritura della vite e l'avvenuta allegagione. Dai rilievi effettuati si evidenzia la comparsa delle prime forme mobili. **Nel prossimo comunicato verranno indicate le date ottimali e i prodotti da utilizzare per il trattamento.**

NOTE PER IL PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER USO SOSTENIBILE DEL FITOFARMACI

- Mancozeb e Folpet sono utilizzabili per tre interventi l'anno (max quattro complessivi);
- Metalaxil-m è utilizzabile per tre interventi l'anno;
- Ciazofamid e Amisulbrom sono utilizzabili per tre volte complessivamente;
- Ametoctradina è utilizzabile per tre interventi l'anno;
- Fosfonato di potassio è utilizzabile per 5 interventi e di disodio per 6 l'anno;
- Cimoxanil è utilizzabile per tre interventi l'anno;
- Fluopicolide è impiegabile per due interventi l'anno;
- Zoxamide è impiegabile per quattro interventi l'anno;
- IBE indicati sono utilizzabili per tre volte complessivamente;
- Metrafenone è utilizzabile per tre interventi l'anno;
- Ciflufenamid è utilizzabile per due interventi l'anno.
- Trifloxystrobin è impiegabile per tre interventi l'anno.

SI RACCOMANDA DI RISPETTARE DOSI E INTERVALLI DI INTERVENTO INDICATI IN ETICHETTA.