



ZONA SERRA D'IVREA E ANFITEATRO MORENICO

AVVISO n° 5 del 18-06-2018

SITUAZIONE

La crescita degli acini continua velocemente, tanto che nelle zone più precoci si è ormai prossimi alla chiusura del grappolo, così come lo sviluppo dei germogli. Sono presenti dalla scorsa settimana nuove macchie di peronospora e sintomi sporadici su grappolo. Compaiono anche nuovi sintomi di black-rot sia su acino che su foglia.

PERONOSPORA

La fase fenologica ancora sensibile e la sporadica comparsa di sintomi rende necessario un intervento a protezione della vegetazione da eseguirsi **ENTRO GIOVEDÌ 21 GIUGNO** impiegando un prodotto a base di **RAME (idrossido, ossicloruro, solfato, ossidulo)** eventualmente in miscela con **FOSFONATO DI POTASSIO** o di **DISODIO (quartet, century, ionifoss, alexin)**

BOTRITE

Nei vigneti solitamente più sensibili il trattamento nella fase fenologica di pre-chiusura risulta fondamentale per la difesa antibotritica e di miglior efficacia se accompagnato da interventi di sfogliatura e sfemminellatura nella fascia dei grappoli. Si consiglia quindi di intervenire utilizzando prodotti a base di **boscalid** (attivo anche contro l'oidio, utilizzabile una volta l'anno), **pirimetanil**, **fenexamide**, **fludioxonil+ciprodinil**, **fluazinam**, **fenpyrazamine**.

OIDIO

Abbinare al trattamento un prodotto a base di **ciflufenamid**, **trifloxistrobin**. (nel caso in cui non si utilizzino **boscalid**). E' consigliato per chi ne avesse la possibilità un intervento con **ZOLFO IN POLVERE**.

SCAPHOIDEUS TITANUS (VETTORE DI FLAVESCENZA DORATA)

Quest'anno il ciclo di sviluppo di Scaphoideus titanus procede con lentezza per cui si deve **ANCORA ATTENDERE PRIMA DELL'ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO**. I monitoraggi sullo stadio di sviluppo continuano e nei prossimi comunicati si potrà essere più precisi.

NOTE PER IL PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER USO SOSTENIBILE DEI FITOFARMACI

- **Fosfonato di Potassio può essere impiegato per cinque interventi;**
- **Fosfonato di disodio può essere impiegato per sei interventi;**
- **Sono utilizzabili 6 kg/ha anno di rame metallo (es forum R 40% di rame a 3.5kg/ha = 1.4 kg/ha, coprantol duo 28% di rame a 3 kg/ha = 0.84 kg/ha)**
- **Ciflufenamid è utilizzabile per due interventi l'anno;**
- **Trifloxystrobin è impiegabile per tre interventi l'anno;**
- **Contro la botrite sono ammessi max due trattamenti anno.**