



## ZONA SERRA D'IVREA E ANFITEATRO MORENICO

**AVVISO n°6 del 28-06-2018**

### SITUAZIONE

Fase fenologica: da pre-chiusura grappolo a grappolo chiuso. Continuano le segnalazioni di peronospora su acino e su foglia e di black-rot anche su acino. Il tempo dovrebbe continuare a mantenersi stabile almeno fino al principio della settimana.

### SCAPHOIDEUS TITANUS

In base ai rilievi sugli stadi di sviluppo del vettore si consiglia di eseguire il trattamento nei giorni compresi tra **VENERDI' 29 GIUGNO E GIOVEDI' 5 LUGLIO** con prodotti a base di **THIAMETOXAM, ACETAMIPRID, CLORPIRIFOS-METILE, ETOFENPROX**.

Dopo aver trattato con l'insetticida e trascorso il tempo di rientro (**almeno 48 ore**) estirpare le piante malate ed eliminare i tralci con sintomi: questo serve per togliere la fonte di fitoplasma che rende infettivo l'insetto vettore (scafoideo).

**Si ricorda che sono vietati i trattamenti insetticidi nel periodo di fioritura della vite ai sensi della L.R. n. 20 del 3/8/98; in presenza di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti, occorre eliminare la vegetazione stessa tramite sfalcio e appassimento o asportazione. Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva.** L'inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all'apicoltura e all'ambiente.

### PERONOSPORA

Si consiglia di mantenere la protezione con prodotti a base di **RAME** intervenendo entro **LUNEDI' 2 LUGLIO**. In presenza di attacchi consistenti abbinare prodotti penetranti a base di **Iprovalicarb, Dimetomorf, Mandipropamid**.

### OIDIO

Abbinare al trattamento un prodotto a base di **ciflufenamid, trifloxistrobin**. E' consigliato per chi ne avesse la possibilità un intervento con **ZOLFO IN POLVERE**.

### **NOTE PER IL PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) MISURA 10.1 :**

- **Ciflufenamid** è utilizzabile per un massimo di due interventi l'anno.
- **Trifloxystrobin** è impiegabile per tre interventi l'anno.
- **Dimetomorf, Mandipropamid, Iprovalicarb** sono utilizzabili per non più di quattro interventi complessivi (non più di tre consecutivi).