



ZONA SERRA D'IVREA E ANFITEATRO MORENICO

AVVISO n°8 del 21-07-2018

SITUAZIONE

Primi accenni di invaiatura in zone e varietà più precoci. Sintomi di peronospora su femminelle e su grappolo piuttosto diffusi. Presenza da sporadica a importante di **black-rot**.

TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI anno 2018

contro *Scaphoideus titanus*

La Flavescenza dorata della vite si previene solo se: si elimina la vegetazione con sintomi della malattia o si capitozzano le piante, senza attendere la vendemmia.

Si esegue la lotta insetticida contro il vettore: intervenire nei giorni tra il **28 LUGLIO E IL 4 AGOSTO** con prodotti a base di **CLORPIRIFOS METILE (reldan)**, **ETOFENPROX (trebon)**, **ACETAMIPRID (epik)**, **THIAMETHOXAM (actara)**.

Dopo aver trattato con l'insetticida e trascorso il tempo di rientro (**almeno 48 ore**) estirpare le piante malate ed eliminare i tralci con sintomi: questo serve per togliere la fonte di fitoplasma che rende infettivo l'insetto vettore (scafoideo).

Si ricorda che sono vietati i trattamenti insetticidi nel periodo di fioritura della vite ai sensi della L.R. n. 20 del 3/8/98; in presenza di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti, occorre eliminare la vegetazione stessa tramite sfalcio e appassimento o asportazione. Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva. L'inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all'apicoltura e all'ambiente.

OIDIO E BLACK-ROT

Nei vigneti in cui siano comparsi sintomi di **Black-rot** si consiglia di utilizzare prodotti a base di **Trifloxystrobin (flint)** o **IBE (difenoconazolo= score, penconazolo= topas, miclobutanil=systhane, tetraconazolo=emerald)**. Negli altri casi utilizzare **zolfo bagnabile**.

N.B.: i grappoli fortemente colpiti da black-rot andrebbero allontanati dal vigneto perché in grado di essere infettivi anche staccati dalla pianta.

PERONOSPORA

Si consiglia di abbinare all'insetticida e all'antioidico un prodotto a base di **RAME**. In presenza di sintomi vitali e su grappolo utilizzare prodotti penetranti a base di **DIMETOMORF**.

NOTE PER IL PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) misura 10.1:

- Sono utilizzabili 6 kg/ha anno di rame metallo (coprantol duo 28% di rame a 3 kg/ha = 0.84 kg/ha, R6 bordeaux 15% rame metallo a 5 kg/ha = 0.75 kg/ha, cuproxat sdi a 15% di rame a 4 l/ha= 0.78 kg/ha)
- Trifloxistobin è impiegabile per tre volte l'anno
- Ibe sono impiegati per tre volte complessivamente (difenoconazolo e miclobutinal una sola volta in alternativa)