



ZONA SERRA D'IVREA E ANFITEATRO MORENICO

AVVISO n° 9 del 09-08-2018

SITUAZIONE

Invaiaatura più o meno avanzata a seconda della varietà e del sito. Permangono sintomi vitali di peronospora favoriti dal clima umido e dalle frequenti bagnature (rugiade prolungate e precipitazioni). In vigneti con carica produttiva elevata è consigliabile eseguire, entro la fine della prossima settimana per erbaluce e barbera e entro l'ultima di agosto per il nebbiolo, un diradamento per favorire il regolare decorso della maturazione. Dopo l'invaiaatura è consigliabile sospendere gli interventi di cimatura, riservandosi di intervenire poi in prossimità della raccolta.

PERONOSPORA

Si consiglia di intervenire con un prodotto a base di **RAME** **entro e non oltre il 13 agosto per l'erbaluce e barbera e il 20 agosto per il nebbiolo** (tempo di carenza 20 giorni). Tale intervento è particolarmente raccomandato nei vigneti con presenza di macchie vitali e con ancora emissione di nuova vegetazione.

OIDIO

Nei vigneti solitamente più sensibili aggiungere ancora uno **ZOLFO BAGNABILE**.

BOTRITE

Le condizioni climatiche sono favorevoli alla malattia. L'intervento con un antibiotritico specifico è in questo caso un valido aiuto nella difesa preventiva dalla malattia. Si consiglia un trattamento da eseguirsi **entro il 13 agosto per erbaluce e barbera e entro il 20 agosto per il nebbiolo**.

Impiegando prodotti a base di **PIRIMETANIL** (scala, 21 gg di carenza), **FLUDIOXONIL+CIPRODINIL** (switch, 21 giorni di carenza), **FENPYRAZAMINE** (prolectus, 14 giorni di carenza), **FENEXAMIDE** (teldor, 7 giorni di carenza, in caso di utilizzo di questo principio attivo si può ritardare di alcuni giorni l'intervento), **TERPENI** (3LOGY, 3 giorni di carenza), **Bacillus subtilis** (serenade max, 3 giorni di carenza, ammesso in agricoltura biologica), **BICARBONATO DI POTASSIO** (armicarb, ammesso in agricoltura biologica, tempo di carenza 1 giorno).