



Cantina della Serra

ZONA SERRA D'IVREA E ANFITEATRO MORENICO

AVVISO n°2 del 10-05-2019

SITUAZIONE

Fase fenologica grappoli separati, la crescita dei germogli prosegue in maniera discontinua e disomogenea, a causa delle basse temperature minime. Al momento non sono segnalati sintomi né di peronospora né di oidio. Le precipitazioni degli scorsi giorni hanno provocato il dilavamento dei prodotti distribuiti con il precedente trattamento. E' consigliato eseguire le operazioni di spollonatura e eliminazione dei germogli doppi in questa fase per ottenere maggiore velocità di lavoro.

PERONOSPORA

Si consiglia di ripristinare la copertura intervenendo entro **MARTEDI' 14 MAGGIO** con prodotti a base di **MANCOZEB, METIRAM, DITHIANON, RAME**. In caso di piogge consistenti prima del trattamento utilizzare prodotti penetranti a lunga persistenza (**DIMETOMORF, IPROVALICARB, MANDIPROPAMID**) in miscela con prodotti di copertura.

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico uno **zolfo bagnabile**.

Nei vigneti con forte presenza di attacchi nello scorso anno o solitamente più sensibili è consigliato utilizzare prodotti a base di **MEPTIL-DINOCAP** o di **SPIROXAMINA**.

NOTE:

- **Mancozeb, Metiram, Folpet e Ditanon sono utilizzabili per tre interventi l'anno;**
- **Fosfonato di sodio è utilizzabile per 6 interventi l'anno, fosfonato di potassio per 5 l'anno, complessivamente max 8 trattamenti l'anno con fosfonati;**
- **Propineb è revocato, possono essere smaltite le scorte aziendali entro il 22/6/2019**
- **Spiroxamina è utilizzabile per tre interventi l'anno;**
- **Meptildinocap è utilizzabile per due interventi l'anno.**
- **Dimetomorf, Iprovalicarb e Mandipropamid sono impiegabili per quattro interventi l'anno di cui max tre consecutivi.**