



Cantina della Serra

ZONA SERRA D'IVREA E ANFITEATRO MORENICO

AVVISO n°3 del 21-05-2019

SITUAZIONE

Nell'ultimo fine settimana sono state diffuse le precipitazioni (da 20 a 40 mm, da venerdì a lunedì). E' ora prevista una fase soleggiata con un probabile nuovo passaggio perturbato a partire da venerdì. Le temperature al di sotto della media continuano a rallentare lo sviluppo vegetativo, con fase fenologica da bottoni fiorali separati a grappoli separati. Si segnalano comparse di sintomi su foglia di oidio, botrite (es. foglie arrotolate dal sigaraio), escoriosi e black-rot.

PERONOSPORA

Considerato la fase fenologica di rischio e il perdurare di tempo perturbato si consiglia di intervenire entro **GIOVEDI' 23 MAGGIO** con prodotti a lunga persistenza a base di **AMETOCTRADINA+FOSFONATO DI POTASSIO (ENERVIN PRO), AMETOCTRADINA+METIRAM (ENERVIN TOP), FOSETIL-AL+ZOXAMIDE+CIMOXANIL (ELECTIS TRIO), ZOXAMIDE+CIMOXANIL (LIETO), FLUOPICOLIDE+FOSETIL-AL (R6 ALBIS), CIAZOFAMID+FOSFONATO DI DISODIO (MILDICUT), METALAXIL-M + MANCOZEB (RIDOMIL GOLD MZ), AMISULBROM+MANCOZEB (SANBLIGHT) o +FOLPET (SANVINO).**

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico un prodotto a pari persistenza: **IBE (tetra-, pen-, fenbu- conazolo), METRAFENONE (VIVANDO), CIFLUFENAMID (CIDELY), FLUXAPYROXAD (SERCADIS).** In vigneti con presenza di black-rot preferire **IBE** possibilmente in formulazione **COMBI** o strobilurine (**TRIFLOXYSTROBIN**) a dosaggi opportuni.

NOTE: si raccomanda di rispettare i dosaggi ad ettaro e gli intervalli di intervento.

- **Mancozeb, Folpet sono utilizzabili per tre interventi l'anno ciascuno;**
- **Fosfonato di disodio è utilizzabile per 6 interventi l'anno, fosfonato di potassio per 5 l'anno, complessivamente max 8 trattamenti l'anno con fosfonati;**
- **Propineb è revocato, possono essere smaltite le scorte aziendali entro il 22/6/2019**
- **Metalaxil-m è utilizzabile per tre interventi l'anno;**
- **Ciazofamid e Amisulbrom sono utilizzabili per tre volte complessivamente;**
- **Ametoctradina è utilizzabile per tre interventi l'anno;**
- **Cimoxanil è utilizzabile per tre interventi l'anno;**
- **Fluopicolide è impiegabile per due interventi l'anno;**
- **Zoxamide è impiegabile per quattro interventi l'anno;**
- **IBE indicati sono utilizzabili per tre volte complessivamente;**
- **Metrafenone è utilizzabile per tre interventi l'anno;**
- **Ciflufenamid è utilizzabile per due interventi l'anno.**
- **Trifloxystrobin è impiegabile per tre interventi l'anno.**
- **Fluxapyroxad è impiegabile per 2 interventi l'anno.**