



Cantina della Serra

ZONA SERRA D'IVREA E ANFITEATRO MORENICO

AVVISO n°4 del 01-06-2019

SITUAZIONE

Il periodo di rialzo delle temperature accelera la crescita dei germogli. Varietà e vigneti più precoci iniziano la fioritura (ritardo di 7-10 giorni rispetto allo scorso anno).

PERONOSPORA

La fase di incipiente fioritura è ad alta sensibilità verso il patogeno. Considerando la rapida crescita dei germogli e la possibilità di un passaggio temporalesco per metà della prossima settimana si consiglia di intervenire entro **MARTEDI' 4 GIUGNO** con prodotti a lunga persistenza a base di **AMETOCTRADINA+FOSFONATO DI POTASSIO (ENERVIN PRO), FOSETIL-AL+ZOXAMIDE+CIMOXANIL (ELECTIS TRIO), ZOXAMIDE+CIMOXANIL (LIETO), FLUOPICOLIDE+FOSETIL-AL (R6 ALBIS), CIAZOFAMID+FOSFONATO DI DISODIO (MILDICUT), METALAXIL-M + MANCOZEB (RIDOMIL GOLD MZ), AMISULBROM+MANCOZEB (SANBLIGHT) o +FOLPET (SANVINO).**

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico un prodotto a pari persistenza: **IBE (tetra-, pen-, fenbu-conazolo: PRODOTTI VARI), METRAFENONE (VIVANDO), CIFLUFENAMID (CIDELY), FLUXAPYROXAD (SERCADIS).** In vigneti con presenza di **black-rot** preferire **IBE** possibilmente in formulazione **COMBI** o strobilurine (**TRIFLOXYSTROBIN**) a dosaggi opportuni.

NOTE: si raccomanda di rispettare i dosaggi ad ettaro e gli intervalli di intervento.

- **Mancozeb, Folpet sono utilizzabili per tre interventi l'anno ciascuno;**
- **Fosfonato di disodio è utilizzabile per 6 interventi l'anno, fosfonato di potassio per 5 l'anno, complessivamente max 8 trattamenti l'anno con fosfonati;**
- **Metalaxil-m è utilizzabile per tre interventi l'anno;**
- **Ciazofamid e Amisulbrom sono utilizzabili per tre volte complessivamente;**
- **Ametoctradina è utilizzabile per tre interventi l'anno;**
- **Cimoxanil è utilizzabile per tre interventi l'anno;**
- **Fluopicolide è impiegabile per due interventi l'anno;**
- **Zoxamide è impiegabile per quattro interventi l'anno;**
- **IBE indicati sono utilizzabili per tre volte complessivamente;**
- **Metrafenone è utilizzabile per tre interventi l'anno;**
- **Ciflufenamid è utilizzabile per due interventi l'anno.**
- **Trifloxystrobin è impiegabile per tre interventi l'anno.**
- **Fluxapyroxad è impiegabile per 2 interventi l'anno.**