



## ZONA SERRA D'IVREA E ANFITEATRO MORENICO

AVVISO n° 5 del 14-6-2019

### SITUAZIONE

Fase fenologia da inizio fioritura a allegagione avvenuta. Le segnalazioni di peronospora su foglia e grappolo sono limitate e sporadiche. Diffuse quasi ovunque macchie su foglia di Black-rot. Nei vigneti ove l'allegagione sia avvenuta è già possibile cimare.

### PERONOSPORA

Considerando la fase fenologica di alta sensibilità si consiglia di ripristinare la protezione intervenendo entro **LUNEDI' 17 GIUGNO e comunque a non più di 10-12 GIORNI DAL PRECEDENTE INTERVENTO** con prodotti di copertura a base di **RAME, MANCOZEB, DITHIANON, METIRAM, FOLPET**, eventualmente in miscela con **FOSETIL-AL, FOSFONATO DI POTASSIO o FOSFONATO DI DISODIO**.

In caso di piogge abbondanti prima del trattamento utilizzare prodotti a base di **METALAXIL-M, DIMETOMORF o MANDIPROPAMID**.

### OIDIO E BLACK-ROT

Abbinare al trattamento antiperonosporico un prodotto a lunga persistenza: **IBE (tetra, pen, fenbu- conazolo), METRAFENONE (VIVANDO), CIFLUFENAMID (CIDELY), FLUXAPYROXAD (SERCADIS)**. In vigneti con presenza di black-rot preferire **IBE** possibilmente in formulazione **COMBI** o strobilurine (**TRIFLOXYSTROBIN**) a dosaggi opportuni.

### SCAPHOIDEUS TITANUS (VETTORE DI FLAVESCENZA DORATA)

**NON TRATTARE DURANTE LA FIORITURA DELLA VITE.** Occorre attendere la fine del periodo di fioritura della vite e l'avvenuta allegagione.

Dai rilievi effettuati si evidenzia la comparsa delle prime forme mobili. **Nei prossimi comunicati verranno indicate le date ottimali e i prodotti da utilizzare per il trattamento.**

### NOTE PER IL PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER USO SOSTENIBILE DEI FITOFARMACI

- **Metalaxil-m è utilizzabile per tre interventi l'anno.**
- **Mancozeb, Folpet sono utilizzabili per tre interventi l'anno ciascuno.**
- **Fosfonato di disodio è utilizzabile per 6 interventi l'anno, fosfonato di potassio per 5 l'anno, complessivamente max 8 trattamenti l'anno con fosfonati.**
- **IBE indicati sono utilizzabili per tre volte complessivamente.**
- **Metrafenone è utilizzabile per tre interventi l'anno;**
- **Ciflufenamid è utilizzabile per due interventi l'anno.**
- **Trifloxystrobin è impiegabile per tre interventi l'anno.**
- **Fluxapiroxad è impiegabile per 2 interventi l'anno.**

**SI RACCOMANDA DI RISPETTARE DOSI E INTERVALLI DI INTERVENTO INDICATI IN ETICHETTA.**