



## ZONA SERRA D'IVREA E ANFITEATRO MORENICO

**AVVISO n°6 del 26-06-2019**

### SITUAZIONE

Fase fenologica: da acino in accrescimento a pre-chiusura grappolo. Sintomi diffusi di oidio anche su grappolo e di black-rot su tutte le varietà. Peronospora molto limitata sia su grappolo che su foglia. Continua il periodo di gran caldo, per ora con previsioni di tempo stabile fino alla metà della prossima settimana.

### SCAPHOIDEUS TITANUS

In base ai rilievi sugli stadi di sviluppo del vettore si consiglia di eseguire il trattamento nei giorni compresi tra **DOMENICA 30 E DOMENICA 7 LUGLIO** con prodotti a base di **ACETAMIPRID, CLORPIRIFOS-METILE, ETOFENPROX, ACRINATRINA, TAU-FLUVALINATE**

Dopo aver trattato con l'insetticida e trascorso il tempo di rientro (**almeno 48 ore**) estirpare le piante malate ed eliminare i tralci con sintomi: questo serve per togliere la fonte di fitoplasma che rende infettivo l'insetto vettore (scafoideo).

**Si ricorda che sono vietati i trattamenti insetticidi nel periodo di fioritura della vite ai sensi della L.R. n. 20 del 3/8/98; in presenza di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti, occorre eliminare la vegetazione stessa tramite sfalcio e appassimento o asportazione. Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva.** L'inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all'apicoltura e all'ambiente.

### OIDIO

Abbinare al trattamento un prodotto a base di **ciflufenamid, trifloxistrobin**. (nel caso in cui non si utilizzi **boscalid**). E' consigliato per chi ne avesse la possibilità un intervento con **ZOLFO IN POLVERE** che in queste situazioni di temperatura esplica al massimo la sua attività.

### PERONOSPORA

Si consiglia di abbinare al trattamento insetticida prodotti a base di **RAME**.

### BOTRITE

Nei vigneti solitamente più sensibili il trattamento nella fase fenologica di pre-chiusura risulta fondamentale per la difesa antibotritica e di miglior efficacia se accompagnato da interventi di sfogliatura e sfemminellatura nella fascia dei grappoli. Si consiglia quindi di intervenire utilizzando prodotti a base di **boscalid** (attivo anche contro l'oidio, utilizzabile una volta l'anno), **pirimetanil, fenexamide, fludioxonil+ciprodinil, fluazinam, fenpyrazamine**.

### **NOTE PER IL PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) MISURA 10.1 :**

- **Ciflufenamid** è utilizzabile per un massimo di due interventi l'anno.
- **Trifloxystrobin** è impiegabile per tre interventi l'anno.
- **Contro la botrite sono ammessi max due trattamenti anno.**
- **Non superare i 4 kg/ha anno di rame metallo**
- **Insetticidi per scaphoideus max 1 trattamento anno per sostanza attiva tranne clorpirifos metile (2 interventi)**