



ZONA SERRA D'IVREA E ANFITEATRO MORENICO

AVVISO n° 7 del 08-07-2019

SITUAZIONE

Fase fenologica: chiusura grappolo. Sintomi diffusi di oidio anche su grappolo e di black-rot su tutte le varietà. Peronospora molto limitata sia su grappolo che su foglia. Continua il periodo di grandine, con possibile passaggio temporalesco per la serata di martedì che dovrebbe portare un abbassamento delle temperature. Si notano sintomi di stress idrico e termico su viti giovani o con carichi elevati di uva. Su queste viti sospendere ogni intervento di potatura verde e se è il caso eliminare la produzione completamente o almeno in parte.

OIDIO E BLACK ROT

Entro la settimana è consigliato per chi ne avesse la possibilità un intervento con **ZOLFO IN POLVERE** che in queste situazioni di temperatura esplica al massimo la sua attività. In alternativa utilizzare **meptil-d-nocap** o **spiroxamina** entro fine settimana nel caso in cui vi siano sintomi su grappolo.

Con presenza associata di black-rot preferire antifungini a duplice azione come gli IBE (**penconazolo, tetraconazolo, mioctobutamil, difenoconazolo**) o strobilurine (**trifloxystrobin**).

Negli altri casi (assenza di oidio e black-rot) utilizzare **ZOLFO BAGNABILE** a dose media di etichetta.

PERONOSPORA

Si consiglia di abbinare al trattamento antifungino prodotti a base di **RAME**. In caso di abbondanti piogge prima del trattamento utilizzare **cinossanil**.

NOTE PER IL PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) MISURA 10.1:

- Spiroxamina è utilizzabile per tre interventi l'anno.
- Trifloxystrobin è impiegabile per tre interventi l'anno.
- Meptil-d-nocap è impiegabile per due interventi l'anno.
- Cinossanil è impiegabile per tre interventi l'anno.
- Non superare i 4 kg/ha anno di rame netto.