



ZONA SERRA D'IVREA E ANFITEATRO MORENICO

AVVISO n° 9 del 13-08-2019

SITUAZIONE

Invaiaitura più o meno avanzata a seconda della varietà e del sito. In vigneti con carica produttiva elevata è consigliabile eseguire, entro la fine della prossima settimana per erbaluce e barbera, e entro l'ultima di agosto per il nebbiolo, un diradamento per favorire il regolare decorso della maturazione. Dopo l'invaiaitura è consigliabile sospendere gli interventi di cimatura, riservandosi di intervenire poi in prossimità della raccolta nel caso in cui si renda necessario.

BOTRITE

Le condizioni climatiche sono favorevoli alla malattia, specialmente nei vigneti in cui sono presenti acini lesionati per vari motivi (oidio, tignoletta, grandine). L'intervento con un antibotritico specifico è in questo caso un valido aiuto nella difesa preventiva dalla malattia. Si consiglia un trattamento da eseguirsi entro il **16 agosto per erbaluce e barbera e entro il 29 agosto per il nebbiolo**. Impiegando prodotti a base di **PIRIMETANIL** (scala, 21 gg di carenza), **FLUDIOXONIL+CIPRODINIL** (switch, 21 giorni di carenza), **FENPYRAZAMINE** (prolectus, 14 giorni di carenza), **FENEXAMIDE** (teldor, 7 giorni di carenza, in caso di utilizzo di questo principio attivo si può ritardare di alcuni giorni l'intervento), **TERPENI** (3LOGY, 3 giorni di carenza), **BACILLUS SUBTILIS** (serenade max, 3 giorni di carenza, ammesso in agricoltura biologica), **BICARBONATO DI POTASSIO** (armicarb, ammesso in agricoltura biologica, tempo di carenza 1 giorno).

TIGNOLETTA

Si riscontrano in alcuni vigneti nuove deposizioni di uova di tignoletta, in caso di elevata presenza (10% dei grappoli infestati) si consiglia un intervento specifico a base di **METOSSIFENOZIDE** (PRODIGY, 14 gg carenza), **INDOXACARB** (STEWART, 10 gg carenza), **EMAMECTINA BENZOATO** (AFFIRM, 7 gg carenza), **SPINOSAD** (LASER, 15 gg carenza), **SPINETORAM** (RADIANT, 7 gg carenza).

PERONOSPORA

Si consiglia di intervenire con un prodotto a base di **RAME** entro e non oltre il 16 agosto per l'erbaluce e barbera e il 29 agosto per il nebbiolo (tempo di carenza 20 giorni). Tale intervento è particolarmente raccomandato nei vigneti con presenza di macchie vitali e con ancora emissione di nuova vegetazione.

OIDIO

Nei vigneti solitamente più sensibili aggiungere ancora **ZOLFO BAGNABILE**.