



ZONA SERRA D'IVREA E ANFITEATRO MORENICO

AVVISO n°7 del 29-06-2020

SITUAZIONE

Fase fenologica: pre-chiusura grappolo. Nell'ultima settimana a seguito del decorso caldo e umido sono comparsi sintomi diffusi di peronospora sia su foglie che su grappolo anche in forma larvata. Si notano in alcune zone anche sintomi preoccupanti di oidio e black-rot. La settimana proseguirà con temperature elevate ma con diffuso rischio di temporali.

SCAPHOIDEUS TITANUS

In base ai rilievi sugli stadi di sviluppo del vettore si consiglia di eseguire il trattamento nei giorni compresi tra **MERCOLEDI' 1 E DOMENICA 5 LUGLIO** con prodotti a base di **ACETAMIPRID, FLUPYRADIFURONE, ETOFENPROX, ACRINATRINA, TAU-FLUVALINATE, PIRETRO.**

Dopo aver trattato con l'insetticida e trascorso il tempo di rientro (**almeno 48 ore**) estirpare le piante malate ed eliminare i tralci con sintomi: questo serve per togliere la fonte di fitoplasma che rende infettivo l'insetto vettore (scafoideo).

Si ricorda che sono vietati i trattamenti insetticidi nel periodo di fioritura della vite ai sensi della L.R. n. 20 del 3/8/98; in presenza di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti, occorre eliminare la vegetazione stessa tramite sfalcio e appassimento o asportazione. Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva. L'inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all'apicoltura e all'ambiente.

OIDIO

Abbinare al trattamento un prodotto a base di **ciflufenamid, fluxapyroxad, trifloxistrobin (preferibile in presenza di black-rot)**. E' consigliato per chi ne avesse la possibilità un intervento con **ZOLFO IN POLVERE** che in queste situazioni di temperatura esplica al massimo la sua attività.

PERONOSPORA

Si consiglia di abbinare al trattamento insetticida prodotti a base di **RAME**, in presenza di sintomi recenti abbinare **Mandipropamid, Dimetomorf**, o la combinazione **Oxathiapiprolin+zoxamide**.

NOTE PER IL PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) MISURA 10.1 :

- **Ciflufenamid** è utilizzabile per un massimo di due interventi l'anno.
- **Trifloxystrobin** è impiegabile per tre interventi l'anno.
- **Non superare i 4 kg/ha anno di rame metallo**
- **Insetticidi per scaphoideus max 1 trattamento anno per sostanza attiva tranne ACETAMIPRID (2 interventi)**