



Cantina della Serra

ZONA SERRA D'IVREA E ANFITEATRO MORENICO

AVVISO n°3 del 18-05-2020

SITUAZIONE

Le intense e diffuse precipitazioni della scorsa settimana (intorno ai 100 mm) unite a temperature superiori ai 10° C possono aver dato inizio a infezioni peronosporiche. Sono inoltre state dilavanti per il trattamento precedente. E' ora prevista una fase soleggiata con temperature diurne anche piuttosto elevate. Lo sviluppo dei germogli procede intenso e rende opportuna quanto mai una gestione tempestiva del verde (spollonatura, palizzatura, eliminazione dei germogli doppi).

PERONOSPORA

Considerato la fase fenologica di rischio si consiglia di intervenire entro **GIOVEDI' 21 MAGGIO** con prodotti a lunga persistenza a base di **AMETOCTRADINA+FOSFONATO DI POTASSIO (ENERVIN PRO)**, **AMETOCTRADINA+METIRAM (ENERVIN TOP)**, **FOSETIL-AL+ZOXAMIDE+CIMOXANIL (ELECTIS TRIO)**, **ZOXAMIDE+CIMOXANIL (LIETO)**, **FLUOPICOLIDE+FOSETIL-AL (R6 ALBIS)**, **CIAZOFAMID+FOSFONATO DI DISODIO (MILDICUT)**, **METALAXIL-M + MANCOZEB (RIDOMIL GOLD MZ)**, **AMISULBROM+MANCOZEB (SANBLIGHT)** o **+FOLPET (SANVINO)**.

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico un prodotto a pari persistenza: **IBE (tetra-, pen-, fenbu- conazolo)**, **METRAFENONE (VIVANDO)**, **CIFLUFENAMID (CIDELY)**, **FLUXAPYROXAD (SERCADIS)**. In vigneti con presenza di black-rot preferire **IBE** possibilmente in formulazione **COMBI** o strobilurine (**TRIFLOXYSTROBIN**) a dosaggi opportuni.

NOTE: si raccomanda di rispettare i dosaggi ad ettaro e gli intervalli di intervento.

- **Mancozeb, Folpet sono utilizzabili per tre interventi l'anno ciascuno;**
- **Fosfonato di disodio è utilizzabile per 6 interventi l'anno, fosfonato di potassio per 5 l'anno, complessivamente max 8 trattamenti l'anno con fosfonati;**
- **Metalaxil-m è utilizzabile per tre interventi l'anno;**
- **Ciazofamid e Amisulbrom sono utilizzabili per tre volte complessivamente;**
- **Ametoctradina è utilizzabile per tre interventi l'anno;**
- **Cimoxanil è utilizzabile per tre interventi l'anno;**
- **Fluopicolide è impiegabile per due interventi l'anno;**
- **Zoxamide è impiegabile per quattro interventi l'anno;**
- **IBE indicati sono utilizzabili per tre volte complessivamente;**
- **Metrafenone è utilizzabile per tre interventi l'anno;**
- **Ciflufenamid è utilizzabile per due interventi l'anno.**
- **Trifloxystrobin è impiegabile per tre interventi l'anno.**
- **Fluxapyroxad è impiegabile per 2 interventi l'anno.**