



ZONA SERRA D'IVREA E ANFITEATRO MORENICO

AVVISO n° 5 del 09-06-2020

SITUAZIONE

Fase fenologia da inizio fioritura a allegagione avvenuta. Continua il periodo di incertezza climatica con abbondanti precipitazioni, in alcune zone anche a carattere grandinigeno. Le segnalazioni di peronospora su foglia e grappolo sono limitate e sporadiche. Nei vigneti ove l'allegagione sia avvenuta è già possibile cimare.

PERONOSPORA

Considerando la fase fenologica di alta sensibilità, la presenza di sintomi e il tempo estremamente incerto si consiglia di ripristinare la protezione intervenendo **APPENA POSSIBILE e comunque a non più di 10-12 GIORNI DAL PRECEDENTE INTERVENTO** con prodotti di copertura a base di **RAME, MANCOZEB, DITHIANON, METIRAM, FOLPET** in miscela con prodotti penetranti a base di **METALAXIL-M, DIMETOMORF, MANDIPROPAMID, OXATHIPIPROLIN.**

OIDIO E BLACK-ROT

Abbinare al trattamento antiperonosporico un prodotto a lunga persistenza: **IBE (tetra, pen, fenbu- conazolo), METRAFENONE (VIVANDO), CIFLUFENAMID (CIDELY), FLUXAPYROXAD (SERCADIS).** In vigneti con presenza di black-rot preferire **IBE** possibilmente in formulazione **COMBI** o strobilurine (**TRIFLOXYSTROBIN**) a dosaggi opportuni.

SCAPHOIDEUS TITANUS (VETTORE DI FLAVESCENZA DORATA)

NON TRATTARE DURANTE LA FIORITURA DELLA VITE. Occorre attendere la fine del periodo di fioritura della vite e l'avvenuta allegagione.

Dai rilievi effettuati si evidenzia la comparsa delle prime forme mobili. **Nei prossimi comunicati verranno indicate le date ottimali e i prodotti da utilizzare per il trattamento.**

NOTE PER IL PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER USO SOSTENIBILE DELEITOFARMACI

- **Metalaxil-m è utilizzabile per tre interventi l'anno.**
- **Dimetomorf e Mandipropamid sono impiegabili per tre volte ciascuno e non più di quattro complessive**
- **Mancozeb, Folpet, Dithianon sono utilizzabili per tre interventi l'anno ciascuno.**
- **IBE indicati sono utilizzabili per tre volte complessivamente.**
- **Metrafenone è utilizzabile per tre interventi l'anno;**
- **Ciflufenamid è utilizzabile per due interventi l'anno.**
- **Trifloxystrobin è impiegabile per tre interventi l'anno.**
- **Fluxapirroxad è impiegabile per 2 interventi l'anno.**

SI RACCOMANDA DI RISPETTARE DOSI E INTERVALLI DI INTERVENTO INDICATI IN ETICHETTA.