



## ZONA SERRA D'IVREA E ANFITEATRO MORENICO

**AVVISO n°6 del 23-06-2020**

### SITUAZIONE

Fase fenologica: da acino in accrescimento a pre-chiusura grappolo. Si nota la comparsa di sintomi sporadici di oidio anche su grappolo e di black-rot e peronospora su tutte le varietà. Il tempo si preannuncia stabile fino alla fine della settimana.

### PERONOSPORA

Considerata la comparsa di sintomi si consiglia di ripristinare la protezione con prodotti a base di **RAME** entro **GIOVEDI' 25 GIUGNO**. In caso di presenza di sintomi diffusi e vitali o su grappolo abbinare al prodotto di copertura un prodotto penetrante a base di **dimetomorf o mandipropamid**.

### OIDIO

Abbinare al trattamento un prodotto a base di **ciflufenamid, trifloxistrobin** (preferibile in presenza di black-rot), **boscalid** (attivo anche contro botritis). E' consigliato per chi ne avesse la possibilità un intervento con **ZOLFO IN POLVERE** che in queste situazioni di temperatura esplica al massimo la sua attività.

### BOTRITE

Nei vigneti solitamente più sensibili il trattamento nella fase fenologica di pre-chiusura risulta fondamentale per la difesa antibotritica e di miglior efficacia se accompagnato da interventi di sfogliatura e sfemminellatura nella fascia dei grappoli. Si consiglia quindi di intervenire utilizzando prodotti a base di **boscalid** (attivo anche contro l'oidio, utilizzabile una volta l'anno), **pirimetanil, fenexamide, fludioxonil+ciprodinil, fluazinam, fenpyrazamine**. Oppure sono utilizzabili i prodotti biologici a base di **bicarbonato di potassio** (efficacie anche contro oidio), **terpeni, bacillus subtilis e amiloliquefaciens**.

### NOTE PER IL PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) MISURA 10.1:

- **Ciflufenamid** è utilizzabile per un massimo di due interventi l'anno.
- **Trifloxystrobin** è impiegabile per tre interventi l'anno.
- Contro la botrite sono ammessi max due trattamenti anno.
- Non superare i 4 kg/ha anno di rame metallo