



# Cantina della Serra

## ZONA SERRA D'IVREA E ANFITEATRO MORENICO

AVVISO n°3 del 27-05-2021

### SITUAZIONE

Fase fenologica di bottoni fiorali separati, primi inizi di fioritura su nebbiolo nelle zone meglio esposte. Le basse temperature notturne rallentano parzialmente lo svolgersi del ciclo vegetativo e si registra un ritardo di una decina di giorni sullo scorso anno.

### PERONOSPORA

Considerato la fase fenologica di allungamento grappolo, la crescita dei germogli, le deboli piogge degli scorsi giorni (10 mm in tutto) e le previsioni di possibile pioggia tra sabato e domenica prossimi, si consiglia di intervenire entro **SABATO 29 MAGGIO** con prodotti a lunga persistenza a base di **AMETOCTRADINA+FOSFONATO DI POTASSIO (ENERVIN PRO), AMETOCTRADINA+METIRAM (ENERVIN TOP), FOSETIL-AL+ZOXAMIDE+CIMOXANIL (ELECTIS TRIO), ZOXAMIDE+CIMOXANIL (LIETO), FLUOPICOLIDE+FOSETIL-AL (R6 ALBIS), CIAZOFAMID+FOSFONATO DI DISODIO (MILDICUT), METALAXIL-M + MANCOZEB (RIDOMIL GOLD MZ), AMISULBROM+MANCOZEB (SANBLIGHT) o +FOLPET (SANVINO), PIRACLOSTROBIN+METIRAM (CABRIO TOP, EFFICACE ANCHE CONTRO OIDIO)**

### OIDIO

Considerando le condizioni di favore per lo sviluppo della malattia (umidità mattutina e vento durante il giorno) si consiglia di abbinare al trattamento antiperonosporico un prodotto a pari persistenza: **IBE (tetra-, pen-, fenbu- conazolo, prodotti vari: LIDAL, TOPAS, INDAR, EMERALD), METRAFENONE (VIVANDO), CIFLUFENAMID (CIDELY), FLUXAPYROXAD (SERCADIS).**

**NOTE:** si raccomanda di rispettare i dosaggi ad ettaro e gli intervalli di intervento.

- **Mancozeb, Folpet sono utilizzabili per tre interventi l'anno ciascuno;**
- **Fosfonato di disodio è utilizzabile per 6 interventi l'anno, fosfonato di potassio per 5 l'anno, complessivamente max 8 trattamenti l'anno con fosfonati;**
- **Metalaxil-m è utilizzabile per tre interventi l'anno;**
- **Ciazofamid e Amisulbrom sono utilizzabili per tre volte complessivamente;**
- **Ametoctradina è utilizzabile per tre interventi l'anno;**
- **Cimoxanil è utilizzabile per tre interventi l'anno;**
- **Fluopicolide è impiegabile per due interventi l'anno;**
- **Zoxamide è impiegabile per quattro interventi l'anno;**
- **Pyraclostrobin è impiegabile per tre interventi l'anno;**
- **IBE indicati sono utilizzabili per tre volte complessivamente;**
- **Metrafenone è utilizzabile per tre interventi l'anno;**
- **Ciflufenamid è utilizzabile per due interventi l'anno.**
- **Fluxapyroxad è impiegabile per 2 interventi l'anno.**