



ZONA SERRA D'IVREA E ANFITEATRO MORENICO

AVVISO n°8 del 29-07-2021

SITUAZIONE

Primi timidi accenni di invaiatura. Il periodo di precipitazioni e tempo instabile concederà pause limitate, continuando il succedersi di fenomeni temporaleschi. Si nota una comparsa di sintomi freschi di peronospora sulle giovani foglie e di black-rot su grappolo, limitata alle parti di vigneto con maggior vigoria e ombreggiamento casi limitati di peronospora larvata. Purtroppo si nota nei vigneti colpiti da grandine la presenza di botrite, il che porta a mantenere alta la guardia contro questo fungo. Si consiglia di ultimare le operazioni di cimatura entro i prossimi 10 giorni permettendo così alle piante di mantenere una parete fogliare sufficiente a portare avanti la maturazione. Discorso a parte nei vigneti grandinati dove ogni foglia è da considerarsi preziosa, per cui in quei casi è meglio sacrificare l'ordine e puntare alla produzione maggiore possibile di zuccheri.

TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI anno 2021

contro *Scaphoideus titanus*

La Flavescenza dorata della vite si previene solo se: si elimina la vegetazione con sintomi della malattia o si capitozzano le piante, senza attendere la vendemmia.

Si esegue la lotta insetticida contro il vettore: intervenire nei giorni tra il **31 LUGLIO E IL 5 AGOSTO** con prodotti a base di **ETOFENPROX** (trebon, carenza 14 gg), **ACETAMIPRID** (epik, carenza 14gg) **questi efficaci anche contro tignoletta**, **TAU FLUVALINATE** (mavrik, carenza 21gg), **ACRINATRINA** (rufast, carenza 28 gg), **FLUPIRADIFURONE** (sivanto prime, carenza 14 gg).

Dopo aver trattato con l'insetticida e trascorso il tempo di rientro (**almeno 48 ore**) estirpare le piante malate ed eliminare i tralci con sintomi: questo serve per togliere la fonte di fitoplasma che rende infettivo l'insetto vettore (scafoideo).

Si ricorda che sono vietati i trattamenti insetticidi nel periodo di fioritura della vite ai sensi della L.R. n. 20 del 3/8/98; in presenza di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti, occorre eliminare la vegetazione stessa tramite sfalcio e appassimento o asportazione. Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva. L'inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all'apicoltura e all'ambiente.

PERONOSPORA

Considerata le precipitazioni degli scorsi giorni (da 30 a 130 mm a seconda delle zone) e la presenza di macchie recenti si consiglia di mantenere la protezione utilizzando un prodotto a base di **RAME**, in caso di piogge prima del trattamento o in presenza diffusa di macchie vitali abbinare **CIMOXANIL**.

OIDIO E BLACK-ROT

Abbinare all'insetticida e all'antiperonosporico un prodotto a base di **ZOLFO BAGNABILE**. In presenza di attacchi significativi contattare il servizio tecnico per concordare la migliore strategia di difesa.

NOTE PER IL PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) misura 10.1 :

- Sono utilizzabili 4 kg/ha anno di rame metallo (coprantol duo 28% di rame a 3 kg/ha = 0.84 kg/ha, R6 bordeaux 15% rame metallo a 5 kg/ha = 0.75 kg/ha, cuproxat sdi a 15% di rame a 4 l/ha = 0.78 kg/ha)